

## **RECOMENDACIONES DURANTE LA GESTACION Y EL PARTO**

### **GESTACIÓN**

- La duración de la gestación es variable, entre 57 y 68 días, siendo la media 63.
- Hay que tener especial cuidado con los tratamientos médicos que se puedan instaurar durante la gestación (siempre bajo prescripción veterinaria).
- Conviene hacer una desparasitación interna a sobre los 40 días de preñez para que luego los cachorros nazcan sin parásitos.
- ¡No hay que restringir el ejercicio porque esté gestante! Siempre y cuando sea moderado
- Alimentación: Hasta la 6ª semana con un pienso de mantenimiento de gama alta y a partir de esa semana, con pienso de cachorro o específico para hembras gestantes.
- La última semana de gestación conviene bañarle y esquilarse el pelo en las zonas mamaria e inguinal.
- Paridera: Una caja de cartón con trapos y tiras de papel, nunca con serrín ni virutas porque son irritantes óculo-respiratorios. Colocarla una semana antes del parto en un lugar que le guste y le sea conocido, que esté bien iluminado cerca de una ventana (para facilitar la ventilación) y cerca de un enchufe (por si necesitáramos una fuente de calor). Hay que ponerle cerca el comedero y el bebedero.

### **PARTO**

#### **Indicaciones del parto**

- De 2 a 3 días antes del parto dejan de comer, están inquietas y presentan estreñimiento. Todo ello es debido a que tienen dolor por las contracciones uterinas.
- Bajada de leche: si es el primer parto se produce dos días antes de éste y si ha tenido más partos dos semanas antes, normalmente.
- Tapón mucoso: a veces, se puede ver un poco de moco vaginal que aparece de 24 a 36 horas antes del parto.
- Bajada de la temperatura corporal. Conviene empezar a medirle la temperatura una semana antes del parto. Hay que hacerlo tres veces al día e ir apuntándolo para ver cual es la temperatura media. En las 24 horas anteriores al parto la temperatura desciende aproximadamente 1°C, teniendo en cuenta que la temperatura normal está sobre los 38,5°C.

A los 45 días de gestación es conveniente hacer una radiografía, con el fin de contar el número exacto de fetos, así en el momento del parto sabremos cuando ha sido expulsado el último cachorro, y por lo tanto el parto habrá finalizado.

## Fases del Parto

1. **Dilatación:** Se dilata el canal del parto. Dura de 4 a 6 horas (hasta 26 horas si es el primer parto). Hay que evitar el estrés en esta fase.
2. **Expulsión de fetos:** Es muy variable en función de número y tamaño cachorros que tenga, de la edad de la madre, de si está obesa... Puede durar de 3 a 12 horas, pero incluso de 24 a 36 horas. El tiempo de nacimiento entre cachorros suele ser de 10 a 60 minutos.  
**Hay que preocuparse y llamar al veterinario si lleva 3 horas con contracciones normales y no expulsa ningún feto, o bien, si lleva 30 minutos con contracciones fuertes y repetidas.** Cuando nazca cada cachorro hay que liberarle de la placenta rompiéndola. Luego hemos de limpiar bien las vías respiratorias y estimularle la respiración masajeándole suavemente el pecho con un trapo limpio.. ¡Cuidado con las madres primerizas porque se despreocupan de sus crías recién nacidas!
3. **Expulsión de las placentas.** Cada placenta se expulsa de manera inmediata ó de 5 a 15 minutos después del feto. Es importante contarlas (tiene que haber tantas como cachorros). SE puede dejar a la madre que se coma 2 ó 3 placentas porque facilitan la involución de útero, aunque en exceso pueden producir diarrea.

## Puerperio

Se llama así al periodo que sigue al parto.

Hay que comprobar que los cachorros están mamando calostro (primera leche). La toma de calostro durante las primeras horas es importante pues es la forma por la cual los cachorros adquieren de su madre. Si la madre no tiene suficiente leche, alimentar a los cachorros con leche maternizada en polvo.

Se suelen producir pérdidas vulvares a las 3 – 4 semanas y son verdosas, sin olor y no dan síntomas.

A la tercera semana del parto hay que controlar una posible hipocalcemia, esto es una bajada del calcio producida por la lactación y que se manifiesta por un cuadro con convulsiones, y que sobre todo se da en razas pequeñas y alimentadas con comida casera.

A la cuarta semana de edad los cachorros pueden empezar a comer una dieta semi-sólida y por tanto se pueden destetar. Además hay que controlar posibles mamicis de la madre, el color de la leche debe ser blanco, y ausente de un fuerte olor.